

MEDICAMENTO / DOSAGEM	FORMA FARMACÊUTICA	ADMINISTRAÇÃO VIA SONDA	VOLUME PARA DILUIÇÃO	RECOMENDAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO VIA SONDA NASOENTERAL	ALTERNATIVA
Aciclovir 200mg	Comprimido	SIM	30 mL	Triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE. ° Pode ser administrado juntamente com a nutrição	Avaliar o uso alternativo da apresentação injetável (Diluição 100mL SF 0,9% por frasco, infundir em 1h)
Ácido Fólico 5mg	Comprimido	SIM	15 mL	Diluir em água. ° Pode ser administrado juntamente com a nutrição	Avaliar uso alternativo da apresentação em gotas (0,2 mg/mL)
Acido tranexamico 250mg	Comprimido	SIM		° Triturar, diluir e administrar	x
Acido ursodesoxicólico 150mg	Comprimido	SIM	15 mL	Triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE	x
Albendazol 4%	Suspensão	SIM	15 mL	Agitar previamente antes do uso	x
Albendazol 400mg	Comprimido	SIM	20-30 mL	Triturar, diluir e administrar	Avaliar uso alternativo da apresentação em suspensão
Alopurinol 100mg	Comprimido	SIM	20 mL	Triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE	x
Amiodarona 200mg	Comprimido	NÃO	X	° Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética; ° Contraindicado a pacientes sensíveis a Iodo; RISCO DE OBSTRUÇÃO da sonda	Avaliar uso alternativo da apresentação injetável
Amitriptilina 25 mg	Comprimido	SIM	x	Pode ser administrado junto com a NE Administrar IMEDIATAMENTE após trituração *FOTOSENSÍVEL	x
Amoxicilina 50 mg/ml	Suspensão	SIM	20-50mL para cada 10mL	Devido a alta viscosidade, diluir com volume de água adicional.	x
Amoxicilina 500 + Clavulanato 125 mg	Cápsula	SIM	x	Princípio ativo com boa solubilidade em água;	Avaliar uso alternativo da apresentação em suspensão ou endovenosa
Amoxicilina 500 mg	Cápsula	NÃO	X	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética	Avaliar uso alternativo da apresentação em suspensão
Atenolol 25 e 50 mg	Comprimido	SIM	x	° Triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE; * RISCO DE OBSTRUÇÃO.	x
Azatioprina 50 mg	Comprimido	NÃO	X	Risco CARCINOGENICO; ° Trituração deve ser realizada no Fluxo Laminar.	x
Azitromicina 600 mg	Suspensão	SIM	30-50 mL de água p/ 10mL	x	x
Bisacodil 5 mg	Drágea	NÃO	x	Não triturar - Revestimento entérico	x
Captopril 12,5 e 25mg	Comprimido	SIM	20-30 mL	Administração simultânea a NE reduz 30-40% da absorção.	x
Carbamazepina 200 mg	Comprimido	SIM	20 mL	° Absorção prejudicada - Mecanismo de interação ° RISCO DE OBSTRUÇÃO da sonda.	Avaliar uso alternativo da apresentação em suspensão
Cefalexina 500mg	Cápsula	NÃO	x	° Absorção prejudicada - Mecanismo de interação descrito; ° RISCO DE OBSTRUÇÃO da sonda.	Avaliar uso alternativo da apresentação em suspensão

Cefalexina 50mg/ml suspensão oral	Suspensão	SIM	20-50mL para cada 10mL	° Absorção prejudicada - Mecanismo de interação; ° RISCO DE OBSTRUÇÃO da sonda.	x
Ciclosporina 25, 50 e 100mg	Cápsula	NÃO	x	NOGÊNICO para manipulador; ° Trituração deve ser realizada no Fluxo Laminar.	Avaliar uso alternativo da formulação suspensão
Ciprofloxacino 500mg	Cápsula	SIM	20 mL	° Administração não recomendada - Adesão nas da sonda; ° RISCO DE OCLUSÃO da sonda.	Avaliar uso alternativo da apresentação injetável.
Clorambucila 2 mg	Comprimido	NÃO	X	NOGÊNICO para manipulador; ° Trituração deve ser realizada no Fluxo Laminar.	x
Dexametasona 0,5 mg	Elixir	NÃO	15 mL	° Uso não recomendado - RISCO DE INTUMECIMENTO E OBSTRUÇÃO da sonda quando misturados a fluidos.	Avaliar uso alternativo da apresentação em comprimido.
Dexametasona 4 mg	Comprimido	SIM	15 mL	° Triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE; ° Administração simultânea a NE ↓ desconforto no TGI.	x
Diazepam 5 e 10 mg	Comprimido	SIM	15 mL	° Triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE; ° Administração simultânea a NE aumenta absorção.	x
Digoxina 0,25 mg	Comprimido	SIM	15 mL	° Triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE; ° Observar efeitos laxativos;	x
Dimenidrinato 50mg + piridoxina 10mg	Comprimido	SIM		° Triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE; ° Pausar NE.	Avaliar uso alternativo da apresentação injetável
Dipirona sodica 500mg	Comprimido	SIM	20 mL	° Triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE; ° Observar os laxativos;	Avaliar uso alternativo da apresentação em comprimido ou endovenosa
Dipirona sódica 500mg/ml	Solução	SIM	10-20 mL para cada 20 gotas	x	x
Enalapril 20 mg	Comprimido	SIM	x	° Triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE; ° Fármaco Higroscópico	x
Espironolactona 100 e 25 mg	Comprimido	SIM	20 mL	° Triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE; ° Administrar junto com NE.	x
Fenitoina 100 mg	Comprimido	SIM	15 mL	° Triturar, diluir e administrar; ° Pausar NE	Avaliar uso alternativo da apresentação Endovenosa
Fenobarbital 100 mg	Comprimido	SIM	10-20 mL	° Triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE; ° Não é necessário pausar NE.	Avaliar uso alternativo da apresentação em gotas ou endovenosa
Fluconazol 100 mg	Comprimido	SIM	15 mL	° Abrir cápsula, aguardar dissolução dos grânulos e administrar IMEDIATAMENTE; ° NÃO USAR SONDAS PVC.	Avaliar uso alternativo da apresentação em gotas ou endovenosa
Furosemida 40 mg	Comprimido	SIM	15 mL	° Triturar, diluir e administrar;	Avaliar uso alternativo da apresentação parenteral
Hidralazina 50 mg	Comprimido	SIM	15 mL	° Triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE; ° Redução significativa na Biodisponibilidade quando ministrado junto com NE.	Avaliar uso alternativo da apresentação parenteral (Diluição em S.F. 0,9%, 50-250mL, infundir em 30-60min)
Hidroclorotiazida 25 mg	Comprimido	SIM	15 mL	° Triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE; ° Redução da absorção quando administrado junto com NE.	Avaliar uso alternativo da apresentação em gotas (5mg/mL)
Hidróxido de alumínio 62 mg/ml	Suspensão	SIM	20 mL de água para cada 10 mL do medicamento	° Diluir em água;	x
Hidroxiureia 500 mg	Cápsula	NÃO	X	° Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética; ° NOGÊNICO para manipulador.	x

Ibuprofeno 100mg/ml	Solução	SIM	20 mL de água para cada 40 gotas	° Compatível com a NE	x
Ibuprofeno 600 mg	Comprimido	SIM	x	r e administrar; ° Compatível com a NE	Avaliar uso alternativo da apresentação em gotas (50mg/mL)
Ivermectina 6 mg	Comprimido	NÃO	x	° Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética;	x
Levomepromazina 40 mg/ml	Solução	SIM	10 mL de água para cada 40 gotas	° Diluir em água e administrar IMEDIATAMENTE	x
Mebendazol 100 mg	Comprimido	SIM	x	r triturado ° Não é necessário pausar NE	x
Mebendazol 20 mg/ml	Suspensão	SIM	15 mL	° Compatível com a NE	x
Mercaptopurina 50 mg	Comprimido	SIM	10 mL	dispersar em água usando sistema fechado; RISCO OCUPACIONAL para manipulador. (CITOTÓXICO)	x
Metadona, cloridrato 10 mg	Comprimido	SIM	15 mL	triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE; ° RISCO DE OBSTRUÇÃO da sonda.	x
Metronidazol 250 mg	Comprimido	SIM	20 mL	r e administrar; ° RISCO DE OBSTRUÇÃO de sonda.	° Avaliar o uso alternativo da apresentação endovenosa ou suspensão.
Metronidazol 40 mg/ml	Suspensão	SIM	20 mL de água para cada 10 mL de suspensão	° Atenção na diluição	° Avaliar o uso alternativo da apresentação endovenosa.
Morfina, sulfato 10 mg	Comprimido	SIM	15 mL	triturar, diluir e administrar; ° Não é necessário pausar a NE;	° Avaliar o uso alternativo da apresentação endovenosa.
Nifedipino 10 mg	Comprimido (Lib. Retardada)	NÃO	x	° Trituração perde características de liberação CO DE TOXICIDADE; ° RISCO DE OBSTRUÇÃO de sonda.	x
Nifedipino 10 mg	Comprimido	SIM	15 mL	triturar, diluir e administrar; ° Recomendado PAUSAR a NE.	x
Nifedipino 20mg retard	Comprimido	NÃO	x	° Trituração perde características de liberação CO DE TOXICIDADE; ° RISCO DE OBSTRUÇÃO de sonda.	x
Oleo mineral puro 1 ml/ml	Solução	SIM	x	ADE ° Não recomendado por conta da ALTA ° Se não houver outra opção, DILUIR	x
Omeprazol 40 mg	Cápsula	NÃO	x	° Não solúvel e água; ° RISCO DE OBSTRUÇÃO de sonda	° Avaliar o uso alternativo da apresentação endovenosa
Ondansetrona, cloridrato 4 e 8 mg	Comprimido	SIM		° Triturar, diluir e administrar.	
Oxicodona 10 mg	Comprimido	NÃO	x	° Trituração perde características de liberação CO DE TOXICIDADE; ° RISCO DE OBSTRUÇÃO de sonda.	x
Paracetamol + codeína 500+ 30 mg	Comprimido	SIM	10 mL	triturar, diluir e administrar; administrar junto com NE.	x
Paracetamol 200mg/ml	Solução	SIM	15 mL	x	x
Paracetamol 500 mg	Comprimido	SIM	20 mL	triturar, diluir e administrar; necessário PAUSAR a NE.	Avaliar o uso alternativo da apresentação em gotas
Polietirenosulfonato de cálcio 90 mg/g envelope	Pó para Resuspensão	SIM	x	° Pode ser misturado e administrado junto com uma dieta apropriada para pacientes com Insuf. Renal.	x
Prednisona 20 e 5 mg	Comprimido	SIM	15 mL	triturar, diluir e administrar; administrar junto com NE.	x

Ranitidina, cloridrato 150 mg	Comprimido	NÃO	15 mL	RISCO DE OBSTRUÇÃO de sonda. (Revestimento e excipientes)	Avaliar o uso alternativo da apresentação injetável
Risperidona 1 mg	Comprimido	SIM	15 mL	Pode ser triturado Administração imediata após pulverização DE OBSTRUÇÃO de sonda	x
Simeticona 40 mg	Comprimido	SIM	20 mL	Não dissolve sem trituração.	Avaliar uso alternativo da apresentação em comprimido
Simeticona 75 mg / ml	Solução	SIM	x	x	x
Sulfametoxazol + trimetoprima 400+80 mg	Comprimido	NÃO	20 mL	RISCO DE OBSTRUÇÃO de sonda. (Excipientes)	Avaliar uso alternativo da apresentação em suspensão ou injetável
Sulfametoxazol + trimetoprima 400+80 mg/ml	Suspensão	SIM	60 mL	° 50 - 60 mL de água para cada 20 mL de suspensão reconstituída	
Sulfato ferroso 40 mg	Comprimido	NÃO	x	° PA instável, fotosensível e oxidável	Avaliar uso alternativo da apresentação em solução oral
Sulfato ferroso 25 mg/ml	Suspensão	SIM	30-50 mL de água	° Administrar junto com NE	x
Tiabendazol 50 mg/ml	Suspensão	SIM	20 mL de água para cada 10 mL de suspensão	° Administrar junto com NE	x
Tramadol, cloridrato 50 mg	Cápsula	SIM	15 mL	dissolver o conteúdo da cápsula ° Pausar NE	Avaliar uso alternativo da apresentação injetável
Tretinoína 10 mg	Cápsula	NÃO	X	NOGÊNICO para manipulador; ° Trituração deve ser realizada no Fluxo Laminar.	x
Varfarina sódica 5 mg	Comprimido	SIM		Triturar, diluir e administrar	° Verificar possível alteração por Heparina (SC)
Voriconazol 200 e 50 mg	Comprimido	SIM	20 mL	Triturar, diluir e administrar IMEDIATAMENTE ° Pausar NE	x

LEGENDA

Administração por sonda sem restrições
Administração por sonda com restrições
Administração por sonda não recomendada